

CODICE SITO IT6030085

3.3 Altre specie

Specie di interesse conservazionistico: (*) = specie inclusa in Direttiva Habitat; (**) = specie inclusa in Convenzione di Berna; (***) = specie inclusa nella Legge Regione Toscana 56/2000 (vedi nota 1); (V-E) = status in Italia secondo Ruffo & Stoch (2006) (V = vulnerabile; E = minacciata). Specie di interesse faunistico, ecologico e biogeografico: (e) = specie endemica italiana; (1) = specie segnalata in poche località in Italia; (2) = specie segnalata in poche località nel Lazio; (2a) = unica località nel Lazio; (3) = località al limite dell'areale in Italia.

| GRUPPO | n. | NOME | POPOLAZIONE | MOTIVAZIONE |
|--------|----|--|--|-------------------|
| | 1 | <i>Baetis lutheri</i> Müller-Liebenau, 1967 | Oriolo R., Fiume Mignone, Le Mole | (V) |
| | 2 | <i>Brachycercus harrisella</i> Curtis, 1834 | Bracciano, F.sso Cupino | (E) (1) |
| | 3 | <i>Caenis martaе</i> Belfiore, 1984 | Bracciano, F.sso Cupino | (e) |
| | 4 | <i>Electrogena grandiaе</i> (Belfiore, 1981) | Manziana, Caldara di Manziana | (V) (1) (2) |
| | 5 | <i>Heptagenia longicauda</i> (Stephens 1835) | Bracciano, F.sso Cupino | (1) (2) |
| | 6 | <i>Rhithrogena adrianaе</i> Belfiore, 1983 | Oriolo R., Fiume Mignone, Le Mole | (E) (1) (2) |
| | 7 | <i>Rhithrogena fiorii</i> Grandi, 1953 | Oriolo R., Fiume Mignone, Le Mole | (E) (e) (1) (2) |
| | 8 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | Oriolo R., F. Mignone | (***) (1) (2) |
| | 9 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Oriolo R., F. Mignone; Caldara di Manziana | (2) |
| | 10 | <i>Boyeria irene</i> (Fonscolombe, 1838) | Oriolo R., F. Mignone | (***) (V) (1) (2) |
| | 11 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linné, 1758) | Oriolo R., F. Mignone | (2) |
| | 12 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linné, 1758) | Oriolo R., F. Mignone | (2) |
| | 13 | <i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840) | Oriolo R., F. Mignone | (***) (1) (2) |
| | 14 | <i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvais, 1805) | Bracciano; L. di Martignano | (***) (2) |
| | 15 | <i>Dolichopoda laetitiae</i> Menozzi, 1920 | Manziana | (***) (V) (e) |
| | 16 | <i>Gerris (Gerris) argentatus</i> Schummel, 1832 | L. di Monterosi | (2) |
| | 17 | <i>Tachycixius pilosus</i> (Olivier, 1791) | Monte Calvario; Manziana | (2) |
| | 18 | <i>Chloriona sicula</i> Matsumura, 1910 | L. di Bracciano, riva NE; L. di Monterosi | (1) (2) |
| | 19 | <i>Scottianella dalei</i> (Scott, 1870) | L. di Bracciano (2a) | (1) (2) |
| | 20 | <i>Austroagallia sinuata</i> (Mulsant & Rey, 1855) | L. di Monterosi | (2) |
| | 21 | <i>Jassargus obtusivalvis</i> (Kirschbaum, 1868) | Monte Calvario (2a) (3) | (1) (2) |
| | 22 | <i>Mocydiopsis monticola</i> Remane, 1961 | L. di Monterosi | (1) |
| | 23 | <i>Penthimia nigra</i> (Goeze, 1778) | Monte Calvario; Bassano R. | (1) (2) |
| | 24 | <i>Calosoma (Calosoma) inquisitor</i> (Linné, 1758) | Manziana, Bosco di Manziana | (***) |
| | 25 | <i>Calosoma (Calosoma) sycophanta</i> (Linné, 1758) | Manziana, Bosco di Manziana | (***) |
| | 26 | <i>Calosoma (Campalita) maderae</i> (Fabricius, 1775) | Manziana | (***) |
| | 27 | <i>Carabus (Archicarabus) rossii</i> Dejean, 1826 | Manziana, cerreta; L. di Martignano; Bracciano | (e) |
| | 28 | <i>Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei</i> Dejean, 1826 | Bosco della Caldara di Manziana (3); Oriolo R. | (e) |
| | 29 | <i>Pterostichus (Argutor) cursor</i> (Dejean, 1828) | L. di Monterosi | (1) (2) |
| | 30 | <i>Pterostichus (Argutor) vernalis</i> (Panzer, 1796) | L. di Monterosi | (2) |
| | 31 | <i>Pterostichus (Melanius) aterrimus</i> (Herbst, 1784) | L. di Monterosi | (2) |
| | 32 | <i>Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus</i> (Illiger, 1798) | L. di Monterosi | (2) |
| | 33 | <i>Pterostichus (Pseudomaseus) gracilis</i> (Dejean, 1828) | L. di Monterosi | (2) |
| | 34 | <i>Pterostichus (Pseudomaseus) oenotrius</i> Ravizza, 1975 | Caldara di Manziana; L. di Monterosi | (2) |
| | 35 | <i>Pterostichus (Pterostichus) micans</i> Heer, 1841 | Caldara di Manziana; Oriolo R. | (e) |
| | 36 | <i>Agabus (Dichonectes) binotatus</i> Aubé, 1837 | Oriolo R. | (1) (2) (e) |
| | 37 | <i>Hydroporus (Sternoporus) longulus</i> Mulsant & Rey, 1861 | Oriolo R. (2a) (3) | (2) |
| | 38 | <i>Hydrochus elongatus</i> (Schaller, 1783) | Oriolo R., La Mola (2a) | (1) (2) |
| | 39 | <i>Cercyon (Cercyon) pygmaeus</i> (Illiger, 1801) | Oriolo R. | (2) |
| | 40 | <i>Coleostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775) | Oriolo R. | (2) |
| | 41 | <i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linné, 1758) | L. di Monterosi | (2) |
| | 42 | <i>Abraeus (Abraeus) perpusillus</i> (Marsham, 1802) | Oriolo R.; Bassano R. | (2) |
| | 43 | <i>Aeletes (Aeletes) atomarius</i> (Aubé, 1842) | Oriolo R.; Manziana | (2) |
| | 44 | <i>Eblisia minor</i> (P. Rossi, 1792) | Bassano; Oriolo | (1) |
| | 45 | <i>Epiurus comptus</i> Erichson, 1834 | Oriolo R.; Bassano R. | (2) |
| | 46 | <i>Eubrachiium hispidulum</i> (Breimi-Wolf, 1855) | Oriolo R.; Bassano R. | (2) |
| | 47 | <i>Hister quadrinotatus</i> Scriba, 1790 | Oriolo R. | (2) |
| | 48 | <i>Kissister minimus</i> (Laporte, 1840) | Bassano R.; Vigna Grande | (2) |
| | 49 | <i>Margarinotus (Ptomister) terricola</i> (Germar, 1824) | Manziana (2a) | (2) |
| | 50 | <i>Margarinotus (Stenister) obscurus</i> (Kugelann, 1792) | Oriolo R. | (2) |
| | 51 | <i>Onthophilus affinis</i> Redtenbacher, 1849 | Vigna Grande | (2) |
| | 52 | <i>Onthophilus globosus</i> (Olivier, 1789) | Manziana (3) | (2) |

| | | | |
|-----|--|--|-------------|
| 53 | <i>Paromalus (Paromalus) flavicornis</i> (Herbst, 1792) | Oriolo R.; Bassano R. | (2) |
| 54 | <i>Platysoma (Platysoma) compressum</i> (Herbst, 1783) | Bassano; Oriolo | (1) (2) |
| 55 | <i>Plegaderus (Plegaderus) dissectus</i> Erichson, 1839 | Oriolo R.; Bassano R. | (2) |
| 56 | <i>Pseudepierus italicus</i> (Paykull, 1811) | Oriolo; Manziana | (2) |
| 57 | <i>Saprinus (Saprinus) acuminatus</i> (Fabricius, 1798) | Manziana | (2) |
| 58 | <i>Saprinus (Saprinus) chalcites</i> (Illiger, 1807) | Manziana | (2) |
| 59 | <i>Hydraena andreinii</i> D'Orchymont, 1934 | Oriolo R., Fiume Mignone (3) | (2) (e) |
| 60 | <i>Hydraena similis</i> D'Orchymont, 1930 | Oriolo R., Fiume Mignone | (e) |
| 61 | <i>Anemadus bianchii</i> Reitter, 1906 | Oriolo R. (2a) | (1) (2) |
| 62 | <i>Attumbra lucida</i> (Kraatz, 1852) | Monte Calvario | (1) (2) |
| 63 | <i>Bathysciola sarteanensis</i> (Bargagli, 1870) | Oriolo R. | (e) |
| 64 | <i>Choleva (Choleva) cisteloides</i> (Frölich, 1799) | Oriolo R. | (2) |
| 65 | <i>Ptomaphagus (Ptomaphagus) pius</i> Seidlitz, 1887 | Oriolo R. | (e) |
| 66 | <i>Acrolocha sulcula</i> (Stephens, 1834) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 67 | <i>Acrulia inflata</i> (Gyllenhal, 1813) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 68 | <i>Batrissodes adnexus</i> (Hampe, 1863) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 69 | <i>Batrissodes venustus</i> (Reichenbach, 1816) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 70 | <i>Bibloporus mayeti</i> Guillebeau, 1888 | Bassano R.; Oriolo R. | (1) (2) |
| 71 | <i>Bryaxis porsema</i> (Reitter, 1881) | Manziana, Bosco di Manziana | (e) |
| 72 | <i>Bryaxis predator</i> (Reitter, 1881) | Oriolo R. | (e) |
| 73 | <i>Emus hirtus</i> (Linné, 1758) | Manziana | (2) |
| 74 | <i>Euplectus brunneus</i> Grimmer, 1841 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 75 | <i>Euplectus karsteni</i> (Reichenbach, 1816) | L. di Bracciano | (1) (2) |
| 76 | <i>Euplectus kirbyi</i> Denny, 1825 | Bassano R.; Oriolo R. | (1) (2) |
| 77 | <i>Euplectus linderi</i> Reitter, 1884 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 78 | <i>Euplectus sanguineus</i> Denny, 1825 | Manziana | (1) (2) |
| 79 | <i>Eusphalerum bargaglii</i> (Luze, 1910) | Oriolo R. | (e) |
| 80 | <i>Eusphalerum italicum</i> (Koch, 1938) | Oriolo R. | (e) |
| 81 | <i>Fagniezia impressa</i> (Panzer, 1805) | L. di Monterosi | (1) (2) |
| 82 | <i>Ocypus italicus</i> (Aragona, 1830) | Oriolo R. | (e) |
| 83 | <i>Omalius allardi</i> Fairmaire & Brisout, 1859 | Vigna Grande | (1) (2) |
| 84 | <i>Omalius cinnamomeum</i> Kraatz, 1857 | Bracciano; Manziana | (1) (2) |
| 85 | <i>Omalius italicum</i> Bernhauer, 1902 | Bracciano; Oriolo R. | (1) (2) |
| 86 | <i>Omalius rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880 | Bracciano | (2) |
| 87 | <i>Paramaurops caeretanus</i> Cerruti, 1957 | Vigna Grande | (e) |
| 88 | <i>Paramaurops exaratus</i> (Baudi, 1875) | Oriolo R.? | (e) |
| 89 | <i>Philorinum sordidum</i> (Stephens, 1834) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 90 | <i>Phyllocladepa ioptera</i> (Stephens, 1832) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 91 | <i>Phyllocladepa palpalis</i> Luze, 1906 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 92 | <i>Phyllocladepa crenata</i> (Gravenhorst, 1802) | Bassano R. | (1) (2) |
| 93 | <i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 94 | <i>Tychobythinus glabratus</i> (Rye, 1870) | Oriolo R. | (e) |
| 95 | <i>Tyrus mucronatus</i> (Panzer, 1805) | Bassano R.; Oriolo R. | (1) (2) |
| 96 | <i>Xylodromus brunneipes</i> (Stephens, 1834) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 97 | <i>Lucanus tetraodon</i> Thunberg, 1806 | Manziana, Bosco di Manziana; Bassano R.; Oriolo R. | (***) (V) |
| 98 | <i>Aphodius (Acrossus) rufipes</i> (Linné, 1758) | Monte Calvario; Manziana | (1) (2) |
| 99 | <i>Aphodius (Ammonoecius) brevis</i> Erichson, 1848 | Manziana | (1) (2) |
| 100 | <i>Aphodius (Biralus) satellitius</i> (Herbst, 1789) | L. di Martignano | (1) |
| 101 | <i>Aphodius (Bodilus) ictericus</i> (Laicharting, 1781) | Manziana | (1) (2) |
| 102 | <i>Aphodius (Euorodalus) paracoenosus</i> Balthasar & Hrubant, | Manziana, Macchia Grande | (1) (2) |
| 103 | <i>Aphodius (Nimbus) contaminatus</i> (Herbst, 1783) | Oriolo R., faggeta | (1) (2) |
| 104 | <i>Psammodius laevipennis</i> A. Costa, 1844 | Anguillara Sabazia | (1) (2) |
| 105 | <i>Chironitis furcifer</i> (Rossi, 1792) | Manziana, Macchia Grande | (V) (1) |
| 106 | <i>Chironitis irroratus</i> (Rossi, 1790) | Manziana, Macchia Grande | (V) (1) |
| 107 | <i>Euonthophagus amyntas</i> (Olivier, 1789) | Manziana, Macchia Grande | (1) (2) |
| 108 | <i>Onthophagus (Onthophagus) illyricus</i> (Scopoli, 1763) | Manziana, Macchia Grande | (1) (2) |
| 109 | <i>Scarabaeus (Scarabaeus) typhon</i> Fischer von Waldheim, 18 | Bracciano; Oriolo R., faggeta | (V) |
| 110 | <i>Esolus berthelemyi</i> Olmi, 1975 | Oriolo R., confl. F.sso Bicione con F. Mignone, | (2) (e) |
| 111 | <i>Limnius opacus</i> Ph. Müller, 1806 | Oriolo R., confl. F.sso Bicione con F. Mignone, | (2) |
| 112 | <i>Limnius perrisi</i> (Dufour, 1843) | Oriolo R., confl. F.sso Bicione con F. Mignone, | (2) |
| 113 | <i>Limnius wolckmari</i> (Panzer, 1793) | Oriolo R., confl. F.sso Bicione con F. Mignone, | (2) |
| 114 | <i>Oulimnius tuberculatus</i> (Ph. Müller, 1806) | Oriolo R., confl. F.sso Bicione con F. Mignone, | (***) (2) |
| 115 | <i>Ampedus glycerus</i> (Herbst, 1784) | Bracciano | (V) (2) |
| 116 | <i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887) | Oriolo R. | (V) (1) (2) |
| 117 | <i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830) | Oriolo R. | (V) (1) (2) |
| 118 | <i>Megapenthes lugens</i> (Redtenbacher, 1842) | Oriolo R. | (E) (1) (2) |
| 119 | <i>Agrilus (Agrilus) croaticus</i> Abeille, 1897 | Bracciano | (1) (2) |
| 120 | <i>Agrilus (Agrilus) elegans</i> Mulsant & Rey, 1863 | Monterosi | (1) (2) |
| 121 | <i>Agrilus (Agrilus) integerrimus</i> Ratzeburg, 1839 | Manziana | (1) (2) |
| 122 | <i>Agrilus (Agrilus) laticornis</i> (Illiger, 1803) | Bracciano; Manziana; L. di Martignano | (1) |
| 123 | <i>Agrilus (Agrilus) obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857 | Bracciano | (1) (2) |
| 124 | <i>Anthaxia (Anthaxia) manca</i> (Linné, 1767) | Bracciano | (V) |
| 125 | <i>Anthaxia (Anthaxia) semicuprea</i> Küster, 1851 | Bracciano | (1) |
| 126 | <i>Eurythyrea micans</i> (Fabricius, 1794) | Bracciano | (1) (2) |
| 127 | <i>Eurythyrea quercus</i> (Herbst, 1780) | Manziana | (1) (2) |
| 128 | <i>Latipalpis plana</i> (Olivier, 1790) | Manziana | (V) |
| 129 | <i>Trachys troglodytes</i> Gyllenhal, 1817 | Bracciano | (2) |
| 130 | <i>Ipedia binotata</i> Reitter, 1875 | Oriolo R., faggeta | (1) (2) |
| 131 | <i>Meligethes angustatus</i> Küster, 1848 | Oriolo R., faggeta | (e) |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 132 | <i>Meligethes gracilis</i> C. Brisout de Barneville, 1863 | Oriolo R., dintorni | (1) (2) |
| 133 | <i>Meligethes sponrafi</i> Audisio, 1977 | Oriolo R., faggeta | (e) |
| 134 | <i>Atomaria (Atomaria) bella</i> Reitter, 1875 | Bassano R. (2a) | (1) (2) |
| 135 | <i>Atomaria (Atomaria) umbrina</i> (Gyllenhal, 1827) | Oriolo R. | (1) (2) |
| 136 | <i>Cryptophagus durus</i> Reitter, 1878 | Oriolo R. | (2) |
| 137 | <i>Cryptophagus labilis</i> Erichson, 1846 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 138 | <i>Cryptophagus skalitzkyi</i> Reitter, 1875 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 139 | <i>Cryptophagus subfumatus</i> Kraatz, 1856 | Oriolo R.; Monte Calvario | (1) (2) |
| 140 | <i>Curelius exiguus</i> (Erichson, 1846) | Oriolo R. | (2) |
| 141 | <i>Akis bacarozzo</i> (Schrank, 1786) | Bracciano | (e) |
| 142 | <i>Asida (Asida) luigionii</i> Leoni, 1909 | Bassano R.; Manziana | (e) |
| 143 | <i>Tentyria italica</i> Solier, 1835 | Bracciano | (e) |
| 144 | <i>Acanthocinus xanthoneurus</i> (Mulsant & Rey, 1852) | Bassano R. | (***) (E) (1) (2) (e) |
| 145 | <i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank, 1781) | Bracciano | (2) |
| 146 | <i>Agapanthia kirbyi</i> (Gyllenhal, 1817) | Bracciano | (1) (2) |
| 147 | <i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linné, 1761) | Monte Calvario (2a) | (2) |
| 148 | <i>Callimus abdominalis</i> (Olivier, 1795) | Manziana | (1) (2) |
| 149 | <i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1812 | Bassano R.; Manziana | (V) |
| 150 | <i>Ergates faber</i> (Linné, 1761) | Monte Calvario | (***) (2) |
| 151 | <i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1792 | Bassano R. | (V) |
| 152 | <i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781) | Manziana | (2) |
| 153 | <i>Molorchus minor</i> (Linné, 1758) | Monte Calvario (2a) | (1) (2) |
| 154 | <i>Oberea (Oberea) oculata</i> (Linné, 1758) | Bracciano | (2) |
| 155 | <i>Pachytodes erraticus</i> (Dalman, 1817) | Monte Calvario; Oriolo R. | (2) |
| 156 | <i>Pedestredorcadion arenarium</i> (Scopoli, 1763) | Bassano R.; Bracciano | (e) |
| 157 | <i>Pedestredorcadion etruscum</i> (Rossi, 1790) | Bassano R.; Monte Calvario | (e) |
| 158 | <i>Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita</i> (Linné, 1767) | Caldara di Manziana | (2) |
| 159 | <i>Phytoecia nigricornis</i> (Fabricius, 1781) | Bracciano; Monte Calvario | (2) |
| 160 | <i>Phytoecia pustulata</i> (Schrank, 1776) | Monte Calvario | (2) |
| 161 | <i>Phytoecia rufipes</i> (Olivier, 1795) | Bracciano | (2) |
| 162 | <i>Poecilium fasciatum</i> (Villers, 1789) | Bassano R. | (1) (2) |
| 163 | <i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | Oriolo R. | (2) |
| 164 | <i>Pogonocherus hispidus</i> (Linné, 1758) | Manziana | (2) |
| 165 | <i>Prionus coriarius</i> (Linné, 1758) | Oriolo R., faggeta; Manziana | (***) |
| 166 | <i>Pseudosphegastes cinerea</i> (Castelnau & Gory, 1836) | Manziana | (V) (1) (2) |
| 167 | <i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linné, 1758) | Bracciano; Manziana | (2) |
| 168 | <i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761) | Manziana; Monte Calvario | (2) |
| 169 | <i>Saperda carcharias</i> (Linné, 1758) | Bracciano | (V) |
| 170 | <i>Stenhomalus (Obriopsis) bicolor</i> (Kraatz, 1862) | Manziana | (1) (2) |
| 171 | <i>Stictoleptura rubra</i> (Linné, 1758) | Monte Calvario | (2) |
| 172 | <i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781) | Bassano R.; Oriolo R. | (1) (2) |
| 173 | <i>Sirangalia attenuata</i> (Linné, 1758) | Monte Calvario (2a) | (2a) |
| 174 | <i>Vesperus luridus</i> (Rossi, 1794) | Bassano R.; Bracciano; | (V) |
| 175 | <i>Xylotrechus antilope</i> (Schönherr, 1817) | Manziana | (V) (1) (2) |
| 176 | <i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank, 1781) | Bracciano | (2) |
| 177 | <i>Aphthona nonstriata</i> (Goeze, 1777) | Bracciano | (1) (2) |
| 178 | <i>Aphthona venustula</i> Kutschera, 1861 | Oriolo R. | (2) |
| 179 | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) samniticus</i> Leonardi & Sa | Bracciano | (e) |
| 180 | <i>Hermaeophaga (Hermaeophaga) mercurialis</i> (Fabricius, 17 | Oriolo R. | (1) (2) |
| 181 | <i>Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus</i> (Fabricius, 1775) | Bassano R. | (2) |
| 182 | <i>Otiorhynchus (Otiorhynchus) caudatus</i> (Rossi, 1792) | Oriolo R. | (e) |
| 183 | <i>Phloeophagus cylindrus</i> Boheman, 1838 | Bassano R. | (1) (2) |
| 184 | <i>Pseudomeira obscurella</i> Pierotti & Bellò, 1994 | Oriolo R.; Bracciano | (V) (1) (e) |
| 185 | <i>Raymondellus latialis</i> Osella, 1977 | Manziana | (2) (e) |
| 186 | <i>Torneuma grouvellei</i> Desbrochers, 1889 | L. di Bracciano | (1) (2) |
| 187 | <i>Sialis fuliginosa</i> Pictet, 1836 | Manziana, F.sso Caldara | (1) (2) |
| 188 | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | Oriolo R., F. Mignone, presso La Mola | (2) |
| 189 | <i>Perlamantispa perla</i> (Pallas, 1772) | Vigna di Valle | (1) (2) |
| 190 | <i>Deleproctophylla australis</i> (Fabricius, 1787) | Anguillara Sabazia | (1) (2) |
| 191 | <i>Panorpa etrusca</i> Willmann, 1976 | Monte Rocca Romana | (1) (2) |
| 192 | <i>Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis</i> (Linné, 1758) | Manziana | (1) (2) |
| 193 | <i>Tipula (Tipula) oleracea</i> Linné, 1758 | Monte Rocca Romana; Manziana | (1) (2) |
| 194 | <i>Simulium (Nevermannia) lundstromi</i> (Enderlein, 1921) | Anguillara Sabazia, emissario L. di Bracciano; | (V) (1) (2) |
| 195 | <i>Simulium (Simulium) intermedium</i> Roubaud, 1906 | Anguillara Sabazia | (1) (2) |
| 196 | <i>Simulium (Simulium) monticola</i> Friederichs, 1920 | Bagni di Vicarello | (V) (1) (2) |
| 197 | <i>Simulium (Simulium) ornatum</i> Meigen, 1818 | Anguillara Sabazia | (1) (2) |
| 198 | <i>Simulium (Simulium) pontinum</i> Rivosecchi, 1960 | Vicarello, sorgente sulfurea | (V) (1) (2) (e) |
| 199 | <i>Simulium (Simulium) variegatum</i> Meigen, 1818 | Vicarello | (2) |
| 200 | <i>Simulium (Wilhemia) lineatum</i> (Meigen, 1804) | Vicarello | (2) |
| 201 | <i>Simulium (Wilhemia) pseudequinum</i> Séguy, 1921 | Anguillara Sabazia, f. Azzone | (V) (1) (2) |
| 202 | <i>Odontomyia flavissima</i> (Rossi, 1790) | Manziana | (1) (2) |
| 203 | <i>Odontomyia hydroleon</i> (Linné, 1758) | Manziana, Casale delle Pietrische | (1) (2) |
| 204 | <i>Odontomyia limbata</i> (Meigen, 1822) | Manziana, Casale delle Pietrische | (1) (2) |
| 205 | <i>Stratiomys concinna</i> Meigen, 1822 | Cesano (2a) | (1) (2) |
| 206 | <i>Chrysotoxum fuscicollatum</i> (De Geer, 1776) | Bassano R. (2a) | (1) (2) |
| 207 | <i>Conops vitellinus</i> Loew, 1847 | Monte Calvario | (1) (2) |
| 208 | <i>Physocephala pusilla</i> (Meigen, 1824) | Manziana, Valle delle Pietrische | (1) |
| 209 | <i>Myopa buccata</i> (Linné, 1758) | Manziana | (1) (2) |
| 210 | <i>Myopa testacea</i> (Linné, 1767) | Manziana | (1) (2) |

| | | | | |
|--|-----|--|---|----------------|
| | 211 | <i>Dalmannia aculeata</i> (Linné, 1761) | Manziana, Valle delle Pietrische | (1) (2) |
| | 212 | <i>Ilione (Ilione) trifaria</i> (Loew, 1847) | Bracciano | (1) (2) |
| | 213 | <i>Sepedon spinipes</i> (Scopoli, 1763) | Anguillara Sabazia | (1) (2) |
| | 214 | <i>Rhyacophila foliacea</i> Moretti, 1981 | Oriolo R., F. Mignone | (e) |
| | 215 | <i>Rhyacophila vulgaris</i> Pictet, 1834 | Oriolo R., F. Mignone (2a) | (2) |
| | 216 | <i>Hydroptila aegyptia</i> Ulmer, 1963 | L. di Bracciano, Bagni; L. di Bracciano, Anguil | (1) (2) |
| | 217 | <i>Orthotrichia tragetti</i> Mosely, 1930 | L. di Monterosi (2a) | (2) |
| | 218 | <i>Oxyethira falcata</i> Morton, 1893 | L. di Monterosi | (2) |
| | 219 | <i>Plectrionemia conspersa</i> (Curtis, 1834) | L. di Monterosi | (2) |
| | 220 | <i>Plectrionemia geniculata</i> McLachlan, 1871 | L. di Monterosi (2a) | (2) |
| | 221 | <i>Polycentropus mertonii</i> Mosely, 1930 | L. di Bracciano, Ruscello Pontenuovo | (e) |
| | 222 | <i>Lype phaeopa</i> (Stephens, 1836) | L. di Monterosi | (1) (2) |
| | 223 | <i>Tinodes maclachlani</i> Kimmins, 1966 | L. di Bracciano, Ruscello Pontenuovo | (2) |
| | 224 | <i>Agrypnia varia</i> (Fabricius, 1793) | L. di Monterosi | (1) (2) |
| | 225 | <i>Halesus appeninus</i> Moretti & Spinelli, 1979 | Oriolo R., F. Mignone | (2) (e) |
| | 226 | <i>Limnephilus flavicornis</i> (Fabricius, 1787) | L. di Monterosi | (2) |
| | 227 | <i>Micropterna sequax</i> McLachlan, 1875 | Oriolo R., F. Mignone | (2) |
| | 228 | <i>Crunoecia irrorata</i> (Curtis, 1834) | Oriolo R., F. Mignone | (2) |
| | 229 | <i>Lepidosoma hirtum</i> (Fabricius, 1775) | Sorgente Acqua Claudia | (1) (2) |
| | 230 | <i>Ceraclea fulva</i> (Rambur, 1842) | Sorgente Acqua Claudia | (1) (2) |
| | 231 | <i>Leptocerus tineiformis</i> Curtis, 1834 | L. di Monterosi | (2) |
| | 232 | <i>Mystacides longicornis</i> (Linné, 1758) | Sorgente Acqua Claudia | (1) (2) |
| | 233 | <i>Oecetis furva</i> (Rambur, 1842) | Sorgente Acqua Claudia | (1) (2) |
| | 234 | <i>Sericostoma italicum</i> Moretti, 1978 | Sorgente Acqua Claudia | (e) |
| | 235 | <i>Beraea maurus</i> Curtis, 1834 | L. di Monterosi | (2) |
| | 236 | <i>Helichopsyche crispata</i> Benoit, 1857 | L. di Monterosi; Sorgente Acqua Claudia | (2) (e) |
| | 237 | <i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Manziana (1908); Monte Rocca Romana; Oriolo | (*) (**) (***) |
| | 238 | <i>Lycaena thersamon</i> (Esper, 1784) | Bracciano | (**) |
| | 239 | <i>Limnitis camilla</i> (Linné, 1764) | Manziana | (2) |
| | 240 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Monte Rocca Romana | (*) (***) |
| | 241 | <i>Lamprotes c-aureum</i> (Knoch, 1781) | Trevignano R. | (1) (2) |
| | 242 | <i>Xestia stigmatica</i> (Hübner, [1813]) | Monte Rocca Romana | (2) |
| | 243 | <i>Chrysura candens</i> (Germar, 1817) | Manziana | (1) (2) |
| | 244 | <i>Cleptes pallipes</i> Lepelletier, 1806 | Manziana (3) | (1) (2) |

