

7 BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA

Aanes R., Linnell J.D.C., Perzanowski K., Karlsen J., Odden J., 1998. Roe deer as prey. In Andersen R., Duncan P., Linnell D.C., The European Roe deer: The Biology of Success. Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS), Oslo. VII, 139-159.

AA.VV., 1997. Documento sulle immissioni faunistiche: linee guida per le introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di uccelli e mammiferi. In Spagnesi M., Toso S., Genovesi P. (Eds), 1997 - Atti del III Convegno nazionale dei biologi della Selvaggina. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 897-905

AA.VV., 1988. I boschi del Lazio: esperienze e considerazioni del Corpo Forestale dello stato operante nel Lazio. Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca.

AA.VV., 1992. I parchi e le riserve naturali del Lazio. Regione Lazio, Assessorato programmazione Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Edizioni Quazar.

AA.VV., 2001. Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2001-2005. Provincia di Siena. Servizio "Risorse Faunistiche - Vigilanza - Riserve Naturali".

AA.VV., 2003. Relazione sullo stato dell'ambiente della Provincia di Viterbo. Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente. www.provincia.vt.it/ambiente/Stato_amb02/default.htm

AA.VV., 2004. Piano di tutela delle acque. Regione Lazio. www.regione.lazio.it/ambiente/piano_acque/index.shtml

Alemanno Massimo, 1996. Specchi del cielo. Viaggio attraverso i laghi del Lazio. Ed. La Conca, Roma.

Andersen R., Linnell J.D.C., 2000. Irruptive potential in roe deer: density-dependent effects on body mass and fertility. *Journal of Wildlife Management*, 64 (3): 698-706.

Baldi A., Giardini L., 2002. Proposta per un piano di selezione del capriolo (*Capreolus capreolus*), maggio 2002. Amministrazione Provinciale, Provincia di Viterbo, documento inedito.

Ballard W. B., Whitman J. S. e Gardner C. I., 1987. Ecology of an exploited wolf population in south-central Alaska. *Wildlife Monographs* 98: 30-36.

Besa M., Genovesi P., 1999. Il manuale della gestione faunistica. Linee guida ed indicazioni tecniche per gli Ambiti Territoriali di Caccia. Greetime, Bologna: 117 pp.

Blasi C., 1993. Il fitoclima del Lazio. Regione Lazio, Ass. Agric. e For., Univ. Roma - La Sapienza.

Blasi C., 1994. Fitoclimatologia del Lazio. *Fitosociologia* 27: 151-175.

Boitani L., Fabbri L., 1983. Censimento dei cani in Italia con particolare riguardo al fenomeno del randagismo. *Ric. Biol. Selvaggina* n.73: 1-51.

Boitani L., P. Ciucci, 1995. Comparative social ecology of feral dogs and wolves. *Ecology, Ethology and Evolution* 7: 49-72

Boitani L., 1997. Le immissioni faunistiche: un approccio basato sulla biologia della conservazione. In Spagnesi M., Toso S., Genovesi P. (Eds), 1997 - Atti del III Convegno nazionale dei biologi della Selvaggina. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 11-19

Bonaparte C.L., 1839. Iconografia della fauna d'Italia. Tomo I: mammiferi ed uccelli. Tipografia Salviucci, Roma.

Borghi J., Campagne M., 1988. Testimonianze archeologiche e ricostruzione storica scavi sistematici nell'abitato. I resti faunistici: pag.103.

Brocato G., Cerilli E., Gabarrini D., Occhini G., 1998. Prima campagna di scavo del sito paleolitico superiore di Valle Arcione (Castel d'Asso, VT). Atti del III Incontro di Studi, Manciano - Farnese: 347-355.

Calò C.M., Perco F., Mingozi M., Biotani L., Corsi F., 1997. Status e prospettive di conservazione del Capriolo (*Capreolus capreolus* L. 1758) in Calabria. In Spagnesi M., Toso S., Genovesi P. (Eds), 1997 - Atti del III Convegno nazionale dei biologi della Selvaggina. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 405-415.

Calò C.M., 2003. Controllo della reintroduzione di capriolo nella Riserva Naturale Regionale "Selva del Lamone". Comune Farnese (VT), Riserva Naturale Regionale "Selva del Lamone". Relazione tecnica non pubblicata.

Camerino L., Lesiona M., 1885. Compendio della fauna italiana. Ditta G.B. Paravia e comp.

Camporeale G. & Bretschneide, 1984. La caccia in Etruria: 204 pp.

Celletti S., Papi R., 2003. Fauna Vertebrata terrestre della Provincia di Viterbo. In AA.VV., 2003. Relazione sullo stato dell'ambiente della Provincia di Viterbo. Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente. www.provincia.vt.it/ambiente/Stato_amb02/default.htm

Cesarini D., Panchetti F., Properzi S., Vannoni S., Venturoli C., 1999. Analisi preliminare sullo status del capriolo nella Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno (VT). Suggestimenti di ricerca e gestione. Dattiloscritto non pubblicato.

Danilkin A., 1996. Behavioural Ecology of Siberian and European roe deer. Edited by Chapman & Hall: 277 pp.

De Grossi Mazzorin J., 1998. Strutture di Sorgenti della Nova. Atti del III Incontro di Studi, Manciano - Farnese: 169-180.

D.R.E.Am Italia, 2001. Piano di Assestamento Forestale, periodo di applicazione 2001-2010, Riserva Naturale Monte Rufeno. Relazione tecnica non pubblicata.

D.R.E.Am Italia, 2001. Piano di Assestamento Forestale, periodo di applicazione 2002-2011, Riserva Naturale Selva del Lamone. Relazione tecnica non pubblicata.

Ferloni M., 1998. I Cervidi. In: "Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria", Simonetta A., Dessì F. (a cura di). Ed. Greentime, Bologna: 225-244.

Focardi S., Raganella Pelliccioni E., Petrucco R., Toso S., 2002. Spatial patterns and density dependence in the dynamics of a roe deer (*Capreolus capreolus*) population in central Italy. *Oecologia*, 130: 411-419.

Fritts S. H. E Mech L. D., 1981. Dynamic, movement, and feeding ecology of a newly protected wolf population in northwestern Minnesota. *Wildlife Monographs* 80: 1-78.

Fruzinski B. Labudzki L., Władzelko M., 1982. Weight and body measurement of forest and field roe deer. *Acta Theriologica*, vol 27, 33 v.

Genovesi P., Dupré E., 2000 Strategia nazionale di conservazione del lupo (*Canis Lupus*): indagine sulla presenza e la gestione dei cani vaganti in Italia. *Biologia e Conservazione della Fauna* 104: 1-33.

Gioli Giuseppe, 1912. Caccia utile e caccia dannosa. Biblioteca di coltura popolare. Zanichelli, Bologna, Istituto di zoologia, Univ.della Sapienza, Roma.

Ghigi A., 1911. Ricerche faunistiche e sistematiche sui Mammiferi d'Italia che formano oggetto di caccia. *Natura* 2: 289-337.

Hellenberg H., 1974. Wilddichte, Die Körpergrösse des Rehes als Bioindikator. *Verhandl. Ges. F. Oekologie, Erlangen* (1974) - Dr. W. Junk bv Publ., The Hague: 141-154.

Hepinstall J.A., Quenn L.P. & Jordan P.A., 1996. Applications of a modified habitat suitability index model for moose. *PE&RS*, 62(11).

Ielardi G., 2001. Guida alle aree protette della Regione Lazio. Edizioni ARP.

IUCN, 1987. IUCN position statement on translocation of living organisms: introductions, reintroductions and re-stocking. [Http://iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/transe.htm](http://iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/transe.htm)

IUCN, 1995. IUCN/SSC Guidelines for re-introductions. [Http://iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm](http://iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm)

Lazzarin G., 1993. La realizzazione di carte tematiche come strumento nella pianificazione faunistica. In DE FRANCESCHI P.F. et al., 1993; Pianificazione e Gestione delle risorse faunistiche, Regione Veneto, Aziende Regionale Foreste.

Lepri G., 1911. "Aggiunte alle ricerche faunistiche e sistematiche sui mammiferi d'Italia che formano oggetto di caccia" in *Bollettino della Società Zoologica Italiana, Serie II, Vol XXII*: 241-250.

Lorenzini R., Lovari S. e Masseti M., 2002. The rediscovery of the Italian roe deer: genetic differentiation and management implications. *Italian Journal of Zoology* 69: 367-379.

Lovari S., Mattioli L., Mazzarone V., Pedone P., Siemoni N., 1989. Confronto di due metodi di censimento del capriolo in ambiente montano appenninico. *Atti del 2° seminario sui censimenti Faunistici dei Vertebrati*, Bologna.

Lovari S., 1993. Evoluzione recente delle popolazioni di grandi Mammiferi della fauna d'Italia. Accademia Nazionale dei Lincei, Contributi del Centro Linceo Interdisciplinare 86: 22-37.

Matteucci C., 1999. Capriolo *Capreolus capreolus*. In "Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna", Toso et al. (a cura di). Regione Emilia-Romagna. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ST.E.R.N.A. s.c.r.l.

Mattioli S., 1994. Le reintroduzioni di Cervidi in Italia, con particolare riferimento all'Appennino. In: Inglis M., cur., La fauna appenninica e la sua conservazione. Airone e Corpo Forestale dello Stato, Caramanico.

Mattioli L., Apollonio M., Mazzarone V. E Centofanti E., 1995. Wolf food habits and wild ungulate availability in the Foreste Casentinesi National Park, Italy. Acta Theriologica 40 (4): 387-402.

Mattioli L., Lovari C., Mazzarone V., Siemoni N., Pedone P., 1991. Ecological aspects of the roe deer (*Capreolus capreolus* L.) population of the Casentinesi Forests National Park. Atti del Convegno Internazionale "Ongules-ungulates 1991", Tolosa 2-6 Settembre 1991.

Meriggi, 1989. Analisi critica di alcuni metodi di censimento della fauna selvatica (Aves, Mammalia). Aspetti teorici ed applicativi. Ric. Biol. Selvaggina, 83: 1-59.

Milne B.T., Johnston K.M. & Forman R.T.T., 1989. Scale-dependent proximity of wildlife habitat in a spatially-neutral Bayesian model. Landscape Ecol., 2 (2).

Morimando F. e Tassoni A., 2003. Manuale di gestione faunistica del territorio. REDA. Edizioni per l'agricoltura.

Nicoloso S. e Orlandi L. , 2001. Avvio della gestione faunistico venatoria di capriolo (*Capreolus capreolus* L.), daino (*Dama dama* L.) e muflone (*Ovis musimon* Pallas) in Provincia di Pistoia. Ambito Territoriale di Caccia PT-16. Relazione non pubblicata.

Nicoloso S. e Orlandi L. , 2000. Il Capriolo, lineamenti di biologia e gestione. Edizioni D.R.E.Am. Italia.

Olmi M., Zapparoli M., 1992. L'ambiente nella Tuscia Laziale: aree protette e di interesse naturalistico della Provincia di Viterbo. Università della Tuscia, Union Printing Edizioni, Viterbo: 11-53.

Orlandi L. e Leonessi L., 2004. "Gestione faunistico venatoria del capriolo (*Capreolus capreolus* L.) nell'Azienda Faunistico Venatoria "Groppo del Vescovo". Stagione venatoria 2004-2005. Piano di Prelievo. D.R.E.AM. Italia s.c.r.l. Relazione non pubblicata.

Orlandi L. e Leonessi L., 2004. "Gestione faunistico venatoria del capriolo (*Capreolus capreolus* L.) in Provincia di Massa e Carrara". Stagione venatoria 2003-2004. Relazione finale. D.R.E.AM. Italia s.c.r.l. Relazione non pubblicata.

Orlandi L., Nicoloso S. , 2000. Progetto relativo alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Provincia di Massa Carrara. Relazione non pubblicata.

Orlandi L., Nicoloso S., Aiardi I., 2002. Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Provincia di Lucca, biennio 2000-2001. Relazione non pubblicata.

Patalano M. E Lovari S., 1993. Food habits and niche overlap of the wolf *Canis lupus* L. 1758 and the red fox *Vulpes vulpes* L. 1758 in a mediterranean mountain area. *Revue Ecologie (Terre Vie)* 48: 279-293.

Pedroli J.C, Blant M., Chiappuis F., Maire J. A., 1981. La biologie du chevreuil (*Caprolus capreolus* L.) dans le Canton Neuchatel (Suisse). Recensement de la population; comparaison de deux methodes. *Mammalia*, 45, n.4.

Pedrotti L., Dupré E., Preatoni D., Toso S., 2001. Banca Dati Ungulati. Status, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. INFS, Biologia e Conservazione della Fauna.

Perco F. e Calò C.M., 1995 The status of roe deer in Italy. In: Wotschikowsky U., cur., Proceeding of the 2nd European Roe Deer Meeting. *Wildbiologische Gesellschaft, München*.

Perco F, Semensato R., Peresin P., 1997. La reintroduzione del Capriolo (*Capreolus capreolus*) nel Parco del Ticino. In Spagnesi M., Toso S., Genovesi P. (Eds), 1997 - Atti del III Convegno nazionale dei biologi della Selvaggina. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, XXVII: 729-735.

Peterson R. O., Woolington J. D. E Baley T. N., 1984. Wolves of the Kenai peninsula, Alaska. *Wildlife Monographs* 88: 1-52.

Pignatti S., 1994. *Ecologia del paesaggio*. UTET, Torino.

Preatoni D.G. & Pedrotti L., 1995. I modelli di valutazione ambientale (MVA) come strumento per la pianificazione faunistica. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, XXVII.

Randi E., Pierpaoli M. e Danilkin A., 1998. Mitochondrial DNA polymorphism in populations of Siberian and European roe deer (*Capreolus pygargus* e *Capreolus capreolus*). *Heredity* 80: 429-437.

Schamberger M. & O'Neill L., 1988. Concepts and constraints of habitat model testing. In: Verner J., Morrison M.L. & Ralph C.J., *Wildlife 2000: Modelling habitat relationship of terrestrial vertebrates*. The University of Wisconsin Press.

Scoppola A., 1995 - *Piante minacciate, vulnerabili o molto rare della provincia di Viterbo - Amm.ne Prov.le di Viterbo*

Spagnesi M., Trocchi V., 1992. La lepre, biologia, allevamento, patologia, gestione. Ed agricole, Bologna: pp.275.

Sterna, Toso S., INFS. *Carta della vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna*

Strandgaard H., 1972. The roe deer (*Capreolus capreolus* L.) population at Kalo and the factors regulating its size. Danish review of game biology. *Swiat Press, Krakow-Warszawa*: 341-348.

Tarello W., 1991. Il cervo e il capriolo. Storia naturale, comportamento, ecologia, miti e leggende, patologia e gestione. Musumeci Editore.

Thompson D. Q., 1952. Travel, range, and food habits of timber wolf in Wisconsin. *Journal of Mammalogy* 33: 429-442.

Tosi G., Toso S., 1992. Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 11: 144 pp.

Toso S., 1999 Capriolo *Capreolus capreolus*. In: Spagnesi M. e Toso S., cur., Iconografia dei Mammiferi d'Italia. Ministero dell'Ambiente INFS.

Ueckermann E., 1952. Renwild und Standort. Allegato a Der Anblick. 5.

Vernesi C., Pecchioli E., Caramelli D., Tiedemann R., Randi E., Bertorelle G., 2002. The genetic structure of natural and reintroduced roe deer (*Capreolus capreolus* L.) populations in the Alps and central Italy, with reference to the mitochondrial DNA phylogeography of Europe. *Molecular Ecology* 11: 1285-1287

Zimmermann E., Guisan A., 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. *Ecological Modelling* 135: 147-186



Codice 1614	Emesso Orlandi L.	<p align="center">D.R.E.Am. Italia s.c.r.l.</p> <p>Via dei Guazzi n.31, Poppi (Ar) - Tel. 0575 52.95.14 Via Enrico Bindi n.14, Pistoia - Tel 0573 36.59.67 http://www.dream-italia.it</p> <p align="right"> <small>AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV</small> =UNI EN ISO 9001/2000= </p>	
Elab.03 Rev.00	Controllato Martini F.		
Data Mar 2005	Approvato Orlandi L.		